Prélèvement pour recherche d'oeufs d'oxyures (Scotch-test)

_C2ENRSCOTC

Attention, le prélèvement doit être fait le matin, avant toute défécation et toilette, et il ne doit pas y avoir eu de prise de suppositoires. Si ces conditions ne sont pas réunies, faire revenir le patient un autre jour si possible

- Si le patient est mineur, ne réaliser le prélèvement qu'en présence d'un parent ou d'une autre personne soignante
- **Préconisations pour le prélèvement :**
  - Port de gants
  - Couper une bande de Scotch transparent de 5 cm environ.
  - Faire pencher le patient en avant.
  - Déplier les plis périanaux et appliquer le coté adhésif sur les plis de la marge anale, à la périphérie de l'anus (et non pas dans le canal anal). Maintenir le Scotch en appuyant quelques secondes.
  - Retirer le Scotch et l'étaler sur la lame support (bien appuyer pour que l'adhérence soit parfaite et chasser le plus possible les bulles d'air).
- **Identifier la lame** avec le nom et prénom du patient, date et heure du prélèvement
- **Compléter** les renseignements cliniques, la demande d'analyses et joindre la prescription
- **Délai et température de conservation** : 24 heures à température ambiante (15 à 25 °C)
- **Il est recommandé d'acheminer le prélèvement au laboratoire dans les plus brefs délais**

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

(Questionnaire à compléter afin d'optimiser l'interprétation des résultats)

Nom ……..……... **Nom de naissance:**……...
Prénom :…… **Date de naissance :**……/……/……
Date du prélèvement : ..../…./….. **Heure du prélèvement :** …….

MOTIF(S) de la demande ? :

□ Présence de signes cliniques d'infection *(entourer les réponses souhaitées)* :
démangeaisons anales / douleurs abdominales / diarrhée / autre : ……

□ Petits vers blancs (environ 1 cm) observés à la surface des selles

□ Contrôle après traitement

□ Autre : ……..……..